Bodenübersichtskarte
1 : 200 000

CC 5534
ZWICKAU

Herausgegeben von
der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe
in Zusammenarbeit mit den Staatlichen Geologischen Diensten
der Bundesrepublik Deutschland

Bodenübersichtskarte 1 : 200 000

Bundesrepublik Deutschland



erschienene Blätter | in Bearbeitung | in Vorbereitung

Diese Bodenübersichtskarte wurde digital erstellt. Anfragen zur Nutzung der Daten bitte an die zuständige Landesbehörde oder an die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Hannover.

Vertrieb der Karte: ILH Scientific Cartography, Schockenriedstr. 44, 70565 Stuttgart

2 Bodenregion der Flusslandschaften

2.1 Böden der Auen

1 Vorherrschend **Vegen** und gering verbreitet Gley-Vegen bis Vega-Gleye aus **Auenlehm** und **Auenschluff,** selten Tschernitzen
ABn, GG-AB, AB-GG, AT: fo-l,u

2 Vorherrschend **Gley-Vegen,** gering verbreitet Vega-Gleye, Auengleye und Vegen aus **Auenlehm** und **-sand** über tiefem fluvatilem Kiessand
GG-AB, AB-GG, GGa, ABn: fo-l,s/f-ks

2.2 Böden der Hochflutlehm-, Terrassensand- und Flussschottergebiete

3 Vorherrschend **Braunerden,** gering verbreitet Braunerde-/Regosole und Pararendzinen aus Kies führendem periglaziärem **Lehm** und **Sand** über tiefem fluvatilem Kies und Sand
BBn, BB-RG, RZn: p-(k)/(s)lf-k,s

6 Bodenregion der Löss- und Sandlösslandschaften

6.2 Böden des Lössbörden

4 Vorherrschend **Pararendzinen** aus **Löss** bis **Sandlöss** über glazifluvatilem **Sand,** gering verbreitet über Geschiebemergel
RZn: ai,p-0,5/lfg-s,g-el

5 Vorherrschend **Pararendzinen** aus **Löss** und gering verbreitet aus Löss über Geschiebemergel, gering verbreitet Pararendzinen bis Rendzinen aus skelettführendem Löss über Ton-, Schluff- und Sandsteinen
RZn: ai,p-0; p-0/g-el; RZn, RRn: p-(v)/sn-*t,*u,*s

6 Vorherrschend **Tschernosome** aus **Löss,** gering verbreitet über Geschiebemergel oder glazifluvatilem Sand
TTn: ai,p-0, a,p-0/g-el/fg-s

7 Überwiegend **Braunerde-Tschernosome** und selten Regosole aus **Sandlöss** über glazifluvatilem **Sand,** selten über Endmoränensand, Schotter und tertiärem Sand, verbreitet **Pararendzinen** aus Sandlöss über glazifluvatilem Sand
BB-TT: p-0/lfg-s,ge-ca,p-0/lfl-k; a,p-0-s; RZn: a,p-0/fg-s; RQn: a,p-0/lfg-s

8 Überwiegend **Braunerde-Tschernosome** aus **Löss** und verbreitet aus Löss über **Geschiebelehm**
BB-TT: a,p-0; a,p-0/g-l

9 Überwiegend **Parabraunerde-Tschernosome** und gering verbreitet Braunerde-Tschernosome aus **Löss** und aus Löss über **Geschiebelehm**
LL-TT, BB-TT: a,p-0; a,p-0/g-l

10 Vorherrschend **Pseudogley-Tschernosome** aus **Sandlöss** über **Geschiebemergel**
SS-TT: a,p-s0/g-el

11 Überwiegend **Braunerden** und gering verbreitet Parabraunerden aus Grus und Schutt führendem **Lösssand** über **Porphyrschutt**
BBn, LLn: p,(z)-0/s0-p-n(<R)

12 Überwiegend **Braunerden,** verbreitet **Pseudogley-Parabraunerden** aus **Lösssand** über fluvatilem **Sand** bis **Schotter** und verbreitet **Parabraunerden** aus **Sandlöss** über fluvatilem Sand bis Schotter
BBn, SS-LL: a,p-0/lfl-ks,sk; LLn: a,p-s0/lfl-ks,sk

13 Überwiegend **Braunerde-Fahlerden** bis **Braunerde-Parabraunerden** aus **Sandlöss** und verbreitet aus Sandlöss über **Geschiebelehm**
BB-LF, BB-LL: a,p-s0; a,p-s0/g-l

14 Überwiegend erodierte **Braunerde-Fahlerden** aus **Löss** und aus Löss über **Geschiebelehm,** verbreitet **Fahlerden** aus Löss und aus Löss über skelettführendem **Lehmfließerden**
eBB-LF: a,p-0; a,p-0/g-l; LFn: a,p-0; a,p-0/(f-t)/-(v)l

15 Überwiegend **Parabraunerde-Pseudogleye** und verbreitet **Pseudogley-Parabraunerden** aus **Sandlöss** über **Geschiebelehm**
LL-SS, SS-LL: a,p-s0/g-l

16 Vorherrschend **Pseudogleye,** gering verbreitet Parabraunerde-Pseudogleye aus **Sandlöss** über **Geschiebelehm,** gering verbreitet Pseudogleye aus Sandlöss über tertiärem Ton
SSn, SS-LL: a,p-s0/g-l, SSn: a,p-s0/-t

17 Vorherrschend **Fahlerden,** verbreitet erodiert, aus **Löss** über **Kalkstein, Mergel** und selten über Geschiebelehm, gering verbreitet Pararendzinen aus skelettführendem Löss über Lehmfließerden und Kalkstein, selten Braunerden (Restcarbonat-Braunerden) aus flachgründigem Löss über Kalkstein
LFn, eLFn: a,p-0/n-*k,*mk,Mg; RZn: p-(v)/pfl-t/*k,Mg); a,p-0/n-*k; BBn: p,a-s0/p-sn(*k)

6.3 Böden der Lösslandschaften des Berglandes

19 Überwiegend **Pararendzinen** aus Grus führendem **Lehm,** verbreitet **Pelosole** und **Kalkpelosole** aus **Ton** und Grus führendem Ton, gering verbreitet Tschernosome aus Grus führendem Lehm aus Schluff- und Tonmergelstein des Keuper
RZn: p-(z)/tn-t,z-t*mk,t,*mk,u); DDn, DDc: p-(z)/ut,(*t,*mk,t); TTn: p-(z)t(*mk,u,*mk,t)

20 Überwiegend **Braunerde-Tschernosome,** verbreitet **Tschernosome** und **Kalktschernosome,** gering verbreitet Parendzinen aus **Löss,** selten über Verwitterungsgesteinen von Schluff- und Tonmergelstein des Keuper
BB-TT, TTn, TCn, RZn: a,p-0; a,p-0/(*mk,u,*mk,t)

21 Vorherrschend **Parabraunerde-Tschernosome,** gering verbreitet Braunerde-Tschernosome und Tschernosom-Parabraunerden aus **Löss,** gering verbreitet Pararendzinen aus Verwitterungslehm von Schluff- und Tonmergelstein des Keuper
LL-TT, BB-TT, TT-LL: a,p-0; RZmc-t(*mk,u,*mk,t)

22 Überwiegend **Kalkpelosole** und **Pararendzinen** aus Grus führendem **Ton,** verbreitet **Braunerden** aus Grus und Schutt führendem **Lehm**
DDc, RZn: p-(z)/(-t,-t,z,t/n-*t,*mk,t; BBn: p-(z,t)/

23 Vorherrschend **Braunerden** aus Grus und Schutt führendem **Lehm,** gering verbreitet Pararendzinen aus Grus und Schutt führendem Kalkstein
BBn: p-(z,t)/(n-*t/,*mk,*t; RZn: p-(z,t)/(fn,*t/-*d,*mk,*t

24 Vorherrschend **Braunerden** und gering verbreitet Podsol- und Ranker-Braunerden aus **Kiessand** oder **Schuttsand** über **Verwitterungsschutt** aus **Konglomeraten** des Perm
BBn, PP-BB, RN-BB: p-ks,(s)/c-n(*t)

25 Überwiegend podsolige **Braunerden,** verbreitet **Podsole,** selten Ranker aus **Kies-** oder **Gruslehm** und **Grusslöss** über **Kiessand** oder **Konglomerat**
pBBn, PPn, RNn: p-k(,z,t,s)/(-ks,n-*c

26 Vorherrschend **Braunerden** bis **Braunerde-Podsole** aus schluffigem bis lehmigem **Kiessand** über sandigem **Kies** und **Schotter,** selten Pseudogley-Braunerden aus kiesigem Lösssand über Sandlossfließerden
BBn, BB-PP: p-(u,)/ks,(k)u)/s/s-sk; SS-BB: p-(k)s0/plf-ka/s/s-sk

27 Überwiegend **Braunerden,** gering verbreitet Parabraunerden und gering verbreitet Pseudogley-Parabraunerden und Parabraunerde-Pseudogleye aus Grus führendem **Löss** über **Grussand, Grusl**ehm oder **Schutt** aus **Granulit**
BBn, LLn, SS-LL, LL-SS: p-(z)/o)-zs,ct,n(*Gr)

28 Überwiegend **Parabraunerden** und **Tschernosem-Parabraunerden** und gering verbreitet erodierte Fahlerden aus **Löss** und Löss über **Geschiebelehm,** selten Braunerden bis erodierte Fahlerden aus Löss über Sand bis Schotter
LLn, TT-LL, eLFn: a,p-0; p-s/lfa-ö; p,a-0/g-fl(,g); BBn, eLFn: p,a-0/f-s,tk,w

29 Vorherrschend **Parabraunerden,** gering verbreitet Braunerden sowie Pseudogley-Parabraunerden aus Grus führendem **Löss** über **Lehmgrus** aus **Tonschiefern, Phylliten**
LLn, BBn, SS-LL: p-(z)/o)-zc-fs(*tsf,*Ph)

30 Vorherrschend **Braunerde-Fahlerden,** verbreitet erodiert, aus **Löss** und verbreitet aus Löss über skelettführigen **Lehmfließerden,** gering verbreitet Pseudogley-Fahlerden aus Löss, selten (in Hanglage) Pararendzinen aus Löss
BB-LF, eBB-LF: p,a-0; p,a-0/plf-(v)l(*u,*s); SS-LF: p,a-0; RZn: p,a-0

31 Überwiegend **Pseudogley-Parabraunerden** und verbreitet **Parabraunerden** aus **Löss,** gering verbreitet Pseudogley-Parabraunerden aus Lösslehmfließerde, gering verbreitet Kolluvisole aus umgelagertem Löss
SS-LL, LL-SS: a-0; SS-LL: plf-0/; YKn: uk-0,0/l

32 Überwiegend **Pseudogley-Parabraunerden** und verbreitet **Braunerde-Pseudogleye,** selten Parabraunerden und Braunerden aus Grus und Kies führendem **Löss** über **Lehmkies** und **-grus** aus **Konglomeraten, Sandsteinen, Tonsteinen** des Perm
SS-LL: BB-SS, LL-SS, LLn, BBn: p-(z,k)/o)(,-tk,)t(*c,*s;*to)

33 Überwiegend erodierte **Fahlerden** und **Parabraunerden** aus **Löss,** gering verbreitet Pseudogley-Parabraunerden aus Löss
eLFn, LLn, SS-LL: p-0, p-0/la-ö

34 Überwiegend erodierte **Fahlerden** aus **Löss** über **Schmelzwassersand, Schotter,** oder tertiärem **Sand,** selten Parabraunerde-Pseudogleye aus Löss über Geschiebelehm
eLFn: p-0/fg-s,f-k,w,s-c; LL-SS: p-0/g-l

35 Überwiegend **Pseudogley-Fahlerden** bis **Parabraunerde-Pseudogleye,** verbreitet erodierte **Fahlerden** und lokal **Gley-Pseudogleye** aus **Löss**
SS-LF, LL-SS, eLFn, GG-SS: p,a-0

36 Überwiegend **Parabraunerde-Pseudogleye,** gering verbreitet Pseudogleye und selten Pseudogley-Parabraunerden aus Grus führendem **Löss** über Grus führendem **Lehm** oder **Ton** aus **Schieferton, Sandstein, Letten, Konglomeraten**
LL-SS, SSn, SS-LL: p-(z)/o)-(z)t,t(*tbl,*s,*tsf,*c)

37 Vorherrschend **Parabraunerde-Pseudogleye,** selten Pseudogleye und Pseudogley-Parabraunerden aus Grus führendem **Löss** über **Schuttlehm** aus **Festgesteinen,** selten Pseudogleye aus Kies führendem Lehm über verfestigten Kiessanden
LL-SS, SSn, SS-LL: p-(z)/(c,p-n)(*M,+Kr,*fe); SSn: p-(k)/s-ks

38 Vorherrschend **Fahlerde-Pseudogleye** bis **Pseudogleye,** gering verbreitet Parabraunerde-Pseudogleye aus **Löss** und aus Löss über toniger **Fließerde** aus **Gesteinszersatz**
LF-SS, SSn, LL-SS: a,p-0; a,p-0/plf-t(c,*t)

39 Vorherrschend **Fahlerde-Pseudogleye** bis **Pseudogleye,** gering verbreitet Parabraunerde-Pseudogleye aus **Löss** und selten aus Löss über tonig-lehmiger **Fließerde** aus **Gesteinszersatz,** oder **Geschiebemergel**
LF-SS, SSn, LL-SS: a,p-0; a,p-0/plf-t(,cMg)

40 Verbreitet **Vegen,** verbreitet **Gley-Vegen** und **Vega-Gleye** aus **Auenschluff** und **-ton,** gering verbreitet Humusgleye aus Auenton und Kolluvisole aus Schluff und Ton
ABn, GG-AB, AB-GG: fo-u,t; GGh: fo-t; YKn: uk-u,t

7 Bodenregion der Berg- und Hügelländer mit hohem Anteil an nichtmetamorphen Sedimentgesteinen im Wechsel mit Löss

7.1 Böden der Gebiete mit hohem Anteil an carbonatischen Gesteinen

41 Überwiegend **Rendzinen** und **Braunerde-Rendzinen,** verbreitet **Pararendzinen,** gering verbreitet Terra fuscen und Kalkpelosole aus Grus und Schutt führendem **Ton** und **Schuttton,** über tiefem Kalk- und Tonmergelstein des Oberen Muschelkalk
RRn, BB-RR, RZn,CFn, DDc: p-(z,n)t,ntn-*mk,k,*mk,t

42 Vorherrschend **Pararendzinen** und **Rendzinen,** selten Pelosol-Rendzinen aus **Schuttlehm** bis **-ton** über **Tonschutt,** gering verbreitet Braunerde-Rendzinen und Parabraunerde-Rendzinen aus flachem Grus- und Schuttton über Kalk-, Kalkmergel- und Tonmergelstein des Muschelkalk
RZn, RRn, DD-RR: p-nt,ntC-tn; BB-RR: p,nt,ntc-*k,*mk,k,*mk,t

43 Vorherrschend **Pararendzinen,** gering verbreitet Rendzinen, selten Parabraunerden aus skelettführigen **Löss** bis Löss über **Lehmfließerden** aus **Kalkstein** und über Kalkstein, selten über Gips
RZn, RRn, LLn: p-(v)/(f-pa,p-0/plf-t(*k); p,a-(v)/(ö,m-*k,*)

44 Vorherrschend **Fahlerden,** verbreitet erodiert, aus **Löss** über **Kalkstein, Mergel** und selten über Geschiebelehm, gering verbreitet Pararendzinen aus skelettführigem Löss über Lehmfließerden und Kalkstein, selten Braunerden (Restcarbonat-Braunerden) aus flachgründigem Löss über Kalkstein
LFn, eLFn: a,p-0/n-*k,*mk,Mg; RZn: p-(v)/pfl-t(*k,Mg); a,p-0/n-*k; BBn: p,a-s0/p-sn(*k)

7.2 Böden der Gebiete mit hohem Anteil an silikatischen Gesteinen

45 Vorherrschend **Pararendzinen** und gering verbreitet Parabraunerden aus skelettführigen **Löss** über **Lehmfließerden** und aus skelettführigem Löss über **Schluff-** und **Sandsteinen,** gering verbreitet aus skelettführigem Lehm über Schluff- und Sandsteinen
RZn, LLn: p-(v)/pfl-t,*u,*s); p-(v)/sh-*u,*s; p-z/lc-t(*u,*t)

46 Vorherrschend **Pelosole, Regosole,** gering verbreitet Kalkpelosole und Pararendzinen aus **Ton** des Oberen Buntsandstein
DDn, RQn, DDc, RZn: c,p-t(*to,*mk,t)

47 Überwiegend **Braunerden** und verbreitet **Regosole** aus skelettführigem **Sandlöss** bis lehmigem **Sand** über **Sand-, und Schuftsteinen,** selten Podsole
BBn, RQn: p-(v)/so,lc; p-(v)/sh-*,*s,*u

48 Überwiegend **Braunerden,** verbreitet **Braunerde-Parabraunerden,** gering verbreitet Pseudogley-Parabraunerden aus skelettführigem **Sandlöss** bis Löss über **Sand-** oder **Schuftsteinen**
BBn, BB-LL: p-(z,s)/(-ks,n-*,*s,*u

49 Überwiegend **Pseudogley-Braunerden** aus flachem skelettführigem **Sandlöss** über lehmigen **Fließerden** und verbreitet podsolige **Braunerden** aus flachem skelettführigen **Lösssand** über **Sandsteinschutt**
SS-BB: p-(v)/sp/plf-st; pBBn: p-(v)/st/c-n(*t)

50 Vorherrschend erodierte **Braunerde-Fahlerden** aus Löss über **Lehmfließerde** oder über **Schluff-** und **Sandsteinen,** gering verbreitet Braunerden aus skelettführigem lehmigem Sand über Sand- und Schuftsteinen
eBB-LF: p-(v)/pfl-t(*u,*s); p-(n-*u,*s; BBn:p-(v)/sh-*,*s,*u

51 Fast ausschließlich erodierte **Fahlerden** bis **Parabraunerde-Pseudogleye** aus skelettführigem Löss über tonigen **Fließerden** über (tiefem) Lehmschutt aus Schluff- und Sandsteinen
eLFn, SS-LF, LL-SS: p-(v)/pfl-t(*u,*s)/pl,-t/s(*u,*s)

52 Überwiegend **Pseudogley-Fahlerden** bis **Parabraunerde-Pseudogleye** aus **Löss** und Löss über **Lehmfließerde** aus **Ton-** und **Schuftsteinen**
SS-LF, LL-SS: pa-0; p,a-0/pfl-t(*t,*u)

7.3 Böden der Gebiete mit hohem Anteil an Löss

53 Vorherrschend **Braunerde-Fahlerden,** verbreitet erodiert, aus **Löss** und verbreitet aus Löss über skelettführigen **Lehmfließerden,** gering verbreitet Pseudogley-Fahlerden aus Löss, selten (in Hanglage) Pararendzinen aus Löss
BB-LF, eBB-LF: p,a-0; p,a-0/pfl-(v)l(*u,*s); SS-LF: p,a-0; RZn: p,a-0

Bodenübersichtskarte 1 : 200 000

Herausgegeben von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe
in Zusammenarbeit mit den Staatlichen Geologischen Diensten der Bundesrepublik Deutschland

Arbeitsgruppe Boden
der Staatlichen Geologischen Dienste

Bodenkundliche Bearbeitung:
W. BRAUNSTHER (TLUG), K. BURSE (TLWJF),
R. SYMANSKI (SLUG), W. KANZ (LfaGB)
Fachliche Redaktion:
W. BRAUNSTHER (TLUG), H. HELMANN (SLUG),
W. KANZ (LfaGB), H. FÖRSTER (Bay GLA)
Gesamtredaktion BUK 200:
E. EBERHARDT & U. STEGGER (BGR)

Bundesrepublik Deutschland
CC 5534 Zwickau

Kartengrundlage: DTK200-V, © Vermessungsverwaltungen der Länder und BKG 2004
© Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Stilleweg 2, 30655 Hannover
Diese Karte ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen nur mit Erlaubnis des Herausgebers. Als Vervielfältigung gelten z. B. Nachdruck, Fotokopie, Mikroverfilmung, Digitalisieren, Scannen sowie Speicherung auf Datenträger.

1 : 200 000
1 0 5 10 15 20 km

Die schwarzen Zahlen im Kartenrand beziehen sich auf die Blatteinteilung und Nummerierung der Topographischen Karten 1 : 25 000.

Kartographie und GIS-Bearbeitung: U. STEGGER (BGR)
Kartographische Endredaktion: Arbeitsbereich Geologische Fachinformationssysteme der BGR (BGR)
Druck: Oeding GmbH, Braunschweig

Hannover 2018



Maßstab 1 : 8 000 000

Die Bodenregionen Deutschlands

1 Küstenholozän
2 (Übergeringale) Flusslandschaften
3 Jungmoränenlandschaften
4 Altmoränenlandschaften
5 Deckerschotterplatten und Tertiärhügelländer im Alpenvorland
6 Löss- und Sandlösslandschaften
7 Berg- und Hügelländer mit hohem Anteil an nichtmetamorphen Sedimentgesteinen im Wechsel mit Löss
8 Berg- und Hügelländer mit hohem Anteil an nichtmetamorphen carbonatischen Gesteinen
9 Berg- und Hügelländer mit hohem Anteil an nichtmetamorphen Sand-, Schluff-, Ton- und Mergelgesteinen
10 Berg- und Hügelländer mit hohem Anteil an Magmatiten und Metamorphiten
11 Berg- und Hügelländer mit hohem Anteil an Ton- und Schluffschiefern
12 Alpen

Blatt CC 5534 Zwickau

Bodengroßlandschaften CC 5534 Zwickau



Maßstab 1 : 1 000 000

2.1 **Böden der Auen**
Auen der Ilm, Saale, Weißen Elster, Pleiße und Mulde
2.2 **Böden der Hochflutlehm-, Terrassensand- und Flussschottergebiete**
Terrassen der Saale und Schnauder
6.2 **Böden der Lösslandschaften des Berglandes**
Westlausitzer Lösshügelland, Zeitz-Altenburger Lösshügelland, Leipziger Land
6.3 **Böden der Lösslandschaften des Berglandes**
Osthügelingisch-Sächsisches Löss-Hügelland
7.1 **Böden der Gebiete mit hohem Anteil an carbonatischen Gesteinen**
Ilm-Saale-Platte, Saale-Muschelkalkplatten
7.2 **Böden der Gebiete mit hohem Anteil an silikatischen Gesteinen**
Untere Unstrut-Platten, Gebiet der mittleren Weißen Elster, Finne, Naumburger Buntsandstein -Hügelland, Ziegelrodaer Buntsandsteinplatte
7.3 **Böden der Gebiete mit hohem Anteil an Löss**
Nordrand der Finne
9.2 **Böden der Gebiete mit hohem Anteil an Sand-, Schluff- und Tongesteinen**
Saale–Sandsteinplatte (Holzland)
9.3 **Böden der Gebiete mit hohem Anteil an Ton- und Schluffgesteinen**
Orlasenke, nördliches Holzland
10.1 **Böden der Gebiete mit hohem Anteil an basischen bis intermediären Magmatiten und Metamorphiten**
Teile des Thüringisch-Vogtländischen Schiefergebirges
10.2 **Böden der Gebiete mit hohem Anteil an sauren bis intermediären Magmatiten und Metamorphiten**
Niederes Westerzgebirge und Vogtland
11.1 **Böden der Ton- und Schluffschiefergebiete, mit wechselnden Anteilen an Grauwacke, Kalkstein, Sandstein und Quarzit; z. T. im Wechsel mit Lösslehm**
Teile des Thüringisch-Vogtländisches Schiefergebirge
Bebauungsflächen von Altenburg, Gera, Jena, Plauen, Weimar und Zwickau
Böden der Bergbaufolgelandschaften
(kursiv: regionale Landschaftsbezeichnungen)

Bodenkundliche Bearbeitungsunterlagen

Thüringen:
Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie (Hrsg.): Digitale Konzeptkarte zur Bodengeologischen Übersichtskarte, Digitale Mittelmaßstäbige Landeskundliche Informationssysteme
Thüringer Landesanstalt für Forst, Jagd und Fischerei (Hrsg.): Digitale Forstliche Standortskartierung 1 : 10 000
SCHMIDT, H. (1996): Bodenkarte von Thüringen 1 : 25 000, Blatt 5036 Borgel.

Sachsen:
Bodenkarte des Freistaates Sachsen 1 : 50 000, Blätter L 4940 Borna und L 5340 Zwickau.
Digitale Bodenkarten 1 : 25 000 der Mittelmaßstäbigen Landwirtschaftlichen Standortskartierung (MMK).
KOPP D. & SCHWANECKE W. (Redaktion): Karten der Forstlichen Standortskartierung. Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie (Hrsg.): Kippsubstratkarten des Freistaates Sachsen 1 : 10 000.

Sachsen-Anhalt
Manuskriptkarten 1 : 25 000 der Mittelmaßstäbigen Landwirtschaftlichen Standortskartierung (MMK).

Autoren unveröffentlichter Karten im Maßstab 1 : 10 000:
KNAUF C.(1994-1998): Bodenkarten der Bergbaufolgelandschaften.
SCHWANECKE W. (Redaktion): Karten der Forstlichen Standortskartierung.

9 Bodenregion der Berg- und Hügelländer mit hohem Anteil an nichtmetamorphen Sand-, Schluff-, Ton- und Mergelgesteinen

9.2 Böden der Gebiete mit hohem Anteil an Sand-, Schluff- und Tongesteinen

54 Überwiegend **Braunerden,** gering verbreitet Braunerde-Podsole, selten Podsol-Braunerden aus Schutt führendem **Sand** und **Lehm,** des Buntsandstein, gering verbreitet aus skelettreichem Sandlöss
BBn, BB-PP, PP-BB: p-(n)s,lf-*sa); p-(v)so

55 Überwiegend **Braunerde-Podsole,** verbreitet **Braunerden** und gering verbreitet Braunerde-/Pseudogleye aus Schutt führendem **Sand** und **Lehm** des Buntsandstein
BB-PP, BBn, BB-SS: p-(n)s,lf-*sa)

56 Vorherrschend **Podsole,** selten Braunerden und Braunerde-/Pseudogleye aus Schutt führenden periglaziärem **Verwitterungsand** aus **Sandstein**
PPn, BBn, BB-SS: p-(n)s(*s)

57 Überwiegend **Pseudogleye,** verbreitet **Braunerde-Pseudogleye,** gering verbreitet Podsol-Pseudogleye, Stagnogleye und Braunerden aus Schutt führendem **Lehm** und **Sand** über tiefem sandig-schluffig-tonigen Zersatz von Sand- und Tonsteinen oder sandig-tonigen Wechselfolgen des Buntsandstein
SSn, BB-SS, PP-SS, SGn, BBn: p-(n)/,s)/c-s,u,t(*s,*t)

58 Überwiegend **Vegen,** verbreitet **Gley-Vegen, Vega-Gleye** aus **Auensand** und **-lehm**
ABn, GG-AB, AB-GG: fo-s,l

59 Vorherrschend **Anmoorgleye** und **Stagnogleye,** gering verbreitet Podsol-Pseudogleye aus Schutt führendem periglaziärem **Lehm** und **Sand** über tiefem Zersatz von Sand- und Tonsteinen oder über sandig-tonigen Wechselfolgen des Buntsandstein
GMn, SGn, PP-SS: p-(n)/(,s/c-s,lf,*s,*to)

9.3 Böden der Gebiete mit hohem Anteil an Ton- und Schluffgesteinen

60 Fast ausschließlich **Pararendzinen, Rendzinen, Braunerden-Pelosole** und **Braunerden** aus teilweise flachem Grus und Schutt führendem periglaziärem **Lehm** und aus **Verwitterungslehm** von **Kalkstein, Tonmergelstein** und **Dolomitstein**
RZn, RRn, BB-RZ, DDn, BBn: p,c-(z,n)/(*k,*mk,t,*d); p,c-(z,n)/(n-*k,*mk,t,*d

10 Bodenregion der Berg- und Hügelländer mit hohem Anteil an Magmatiten und Metamorphiten

10.1 Böden der Gebiete mit hohem Anteil an basischen bis intermediären Magmatiten und Metamorphiten

61 Fast ausschließlich **Braunerden** aus Grus und Schutt führendem **Lehm** und periglaziärem **Löss** sowie aus sandig-lehmigem **Verwitterungssubstrat** aus **Schiefer-** und **Quarzitgesteinen**
BBn: p-(z,t)/(,z,n)0; c-s,t(*M,*s)

62 Fast ausschließlich **Braunerden** aus Grus und Schutt führendem **Lehm** und periglaziärem **Löss** sowie aus **Schuttlehm** und lehmigem **Verwitterungssubstrat** aus **Schiefergesteinen** und **Diabas**
BBn: p-(z,t)/(,z,n)0; c-t/(,(s)(*M,+D)

63 Überwiegend **Braunerden,** verbreitet **Hangpseudogleye,** selten Humuspseudogleye aus **Grus-** oder **Schuttlehm** über **Lehmschutt** basischer **Vulkanite** und **Metamorphite**
BBn, SGg, SSh: p,u-(,z,n)0/,-t/(,+Vh,*Mb)

64 Vorherrschend **Pseudogleye** und **Braunerde-Pseudogleye,** gering verbreitet Anmoorpseudogleye aus Grus und Schutt führenden **Lehm** und periglaziärem **Löss** sowie aus schluffig-tonigem **Zersatz** von **Schiefergesteinen**
SSn, BB-SS, SS-BB: p-(z,n)/(,z,n)0; c-u,t(*M)

65 Überwiegend **Humuspseudogleye,** gering verbreitet Pseudogleye, gering verbreitet Pseudogley-Braunerden aus **Schuttlehm** über **Diabasschutt**
SSh, SSn, SS-BB: p-t/l/c-n(+D)

10.2 Böden der Gebiete mit hohem Anteil an sauren bis intermediären Magmatiten und Metamorphiten

66 Fast ausschließlich **Braunerden,** selten podsolige Braunerden und Pseudogley-Braunerden aus Grus führendem **Sand** und **Lehm** über **Verwitterungsgrus** aus **Granit**
BBn, pBBn, SS-BB: p,u-(z)s,(,)/(c,p-r(*G)

67 Überwiegend **Braunerden,** verbreitet **Pseudogley-Braunerden** und selten Ranker-Braunerden aus Grus oder Schutt führendem **Lehm, Schluff** und **Sand** über **Lehmschutt** intermediärer bis saurer **Metamorphite**
BBn, SS-BB, RN-BB: p-(z,n)/(,u,s)(,v,-)n(*Gn,*Gl,*Ph)

68 Überwiegend **Braunerden,** verbreitet **Pseudogley-Braunerden,** selten podsolige Braunerden und Podsol-Braunerden aus **Gruslöss** über **Lehm-** und **Sandschutt** oder **-grus** karbonatfreier **Metamorphite**
BBn, SS-BB, pBBn, PP-BB: p,u(z)(,n-(,s)n(*Gn,*Gl,*Ph)

69 Vorherrschend **Podsol-Braunerden,** gering verbreitet podsolige Braunerden und Pseudogley-Braunerden aus **Grusl**ehm und **-schluff** über **Lehmgrus** karbonatfreier **Metamorphite**
PP-BB, pBBn, SS-BB: p-(z,t,u)/(,p-s)(*Gn,*Gl,*Ph)

70 Vorherrschend **Podsol-Braunerden,** gering verbreitet Braunerde-/Podsole und Acker-Braunerde-/Podsole, selten Braunerden und Pseudogley-Braunerden aus **Grusl**ehm über **Verwitterungsgrus** und **-schutt** saurer **Plutonite** und **Vulkanite**
PP-BB, BB-PP, PBBv-PP, BBn, SS-BB: p-z/(c,p-z,*t)(,+R)

71 Überwiegend **Pseudogleye,** gering verbreitet Hangpseudogleye und Braunerde-Pseudogleye, selten Braunerden aus Grus führendem **Lehm** über **Lehmgrus** und **-schutt** saurer bis intermediärer **Festgesteine,** selten Pseudogley-Kolluvisole aus Kolluviallehm und -schluff über Lehmgrus und -schutt saurer bis intermediärer Festgesteine
SSn, SSg, BB-SS, BBn: p-(,z)/(p-z,)n(*fe,*Lst,+Kr); SS-YK: uk-t,u/(z,t(*Lst,+Kr)

72 Vorherrschend **Pseudogleye,** selten Braunerde-Pseudogleye und Pseudogley-Kolluvisole sowie Auenpseudogleye aus Grus führendem **Löss** über **Lehmschutt** aus **Festgesteinen**
SSn, BB-SS, SS-YK, aSS: p,u-(z)o)/p,c-tn(*M,*fe,+Kr)

73 Vorherrschend **Stagnogleye,** verbreitet **Pseudogleye,** selten Anmoorstagnogleye und Moorstagnogleye aus Grus führendem **Lehm** über **Verwitterungsschuttlehm** karbonatfreier **Metamorphite** oder saurer bis intermediärer **Magmatite**
SGn, SSn, SGm: SGo: p,u-(z)/(c-ni(*Lst,+Kr)

74 Vorherrschend **Gleye,** gering verbreitet Gley-Vegen und Vega-Gleye aus **Auenlehm, -schluff** und **-sand** über tiefem fluvatilem Sand/kies
GGh, GG-AB, AB-GG: fo-l,u,s/lf-sk

75 Überwiegend **Erd-Hochmoore** und **Hochmoore** aus **Hochmoortorf,** häufig über tiefem Grustehm, verbreitet **Moorstag-nogleye** und selten Stagnogleye aus flachem Hochmoortorf über Grustehm aus Magmatiten und Metamorphiten
tKHn, HHn, og-Hh, og-HHp-z(tM,+Kr); SGo, SGn: og-HHp-z(tM,+Kr)

11 Bodenregion der Berg- und Hügelländer mit hohem Anteil an Ton- und Schluffschiefern

11.1 Böden der Ton- und Schluffschiefergebiete, mit wechselnden Anteilen an Grauwacke, Kalkstein, Sandstein und Quarzit; z. T. im Wechsel mit Lösslehm

76 Überwiegend **Braunerden,** verbreitet **Braunerde-Ranker** und Braunerde-Regosole, gering verbreitet Braunerde-/Pseudogleye und Pseudogleye aus lehmigem **Schutt** über **Schiefergesteinen, Grauwacken** und **Quarziten**
BBn, BB-HN, BB-RQ, BB-SS, SSn: p-ks/n-*tsf,*q,*Q

77 Überwiegend **Braunerde-Podsole,** verbreitet **Braunerden** und gering verbreitet Braunerde-/Pseudogleye aus Schutt führendem **Sand** und **Lehm** des Buntsandstein
BB-PP, BBn, BB-SS: p-(n)s,lf-*sa)

78 Fast ausschließlich **Braunerden,** selten Braunerde-/Regosole aus **Grus-** oder **Schuttschluff, -sand** oder **-lehm** über schluffigen, sandigen oder lehmigen Verwitterungsgrus oder -schutt aus **Grauwacke**
BBn, BB-RQ: p-(u,